



## IbuHEXAL® plus Paracetamol

### IbuHEXAL® plus Paracetamol



#### Der 4-fach Effekt von IbuHEXAL® plus Paracetamol:

wirkt stark

**plus:** schneller als Ibuprofen alleine  
(im Vergleich zu Ibuprofen 400 mg)

**plus:** länger anhaltend als Paracetamol alleine

**plus:** besser verträglich durch die niedrige  
Dosierung von Ibuprofen

#### Die Schmerztablette mit 4-fach Effekt: stark, schnell, langanhaltend und gut verträglich

Geburtstagsfeier? Umzug? Urlaub? Akute Schmerzen erschweren uns den Alltag, ganz besonders zu den wichtigsten Anlässen. Wirken Sie dem Schmerz entgegen! Die effektive Kombination aus Ibuprofen und Paracetamol wirkt schnell, langanhaltend und gut verträglich z.B. gegen Kopf-, Rücken- und Gliederschmerzen.

#### Was zeichnet die Kombination aus Ibuprofen und Paracetamol aus?

IbuHEXAL® plus Paracetamol verbindet die Vorteile beider Wirkstoffe in einem Medikament. Das Arzneimittel wirkt stark durch die unterschiedlichen Wirkorte und -mechanismen von Ibuprofen und Paracetamol. Dank Ibuprofen wirkt IbuHEXAL® plus Paracetamol zudem länger anhaltend als reines Paracetamol und hat bis zu 8 Stunden Wirkdauer. Durch die geringe Dosierung des Wirkstoffs Ibuprofen (200 mg) ist das Medikament für Ihren Magen gut verträglich. Paracetamol verleiht IbuHEXAL® plus Paracetamol zudem seine schnell schmerzlindernde Wirkung (innerhalb von 15 Minuten). Somit verbindet sich in diesem Produkt das Beste aus zwei Welten.

#### Bei welchen Schmerzen kann ich IbuHEXAL® plus Paracetamol anwenden?

Zur akuten Linderung leichter bis mäßig starker Schmerzen, zum Beispiel bei:

- Kopfschmerzen
- Rückenschmerzen
- Muskel- und Gelenkschmerzen
- Zahnschmerzen
- Regelschmerzen

#### Die starke Kombination aus Paracetamol und Ibuprofen

IbuHEXAL® plus Paracetamol enthält die Wirkstoffe 500 mg Paracetamol und 200 mg Ibuprofen und ist für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet. Die beiden Wirkstoffe haben sich schon lange als Teil unserer Hausapotheke bewährt. Beide wirken auf unterschiedliche Weise und an unterschiedlichen Stellen im Körper. Ibuprofen wirkt dabei noch entzündungshemmend.

Aufgrund dessen führt die Kombination in einer einzigen Schmerztablette zu einer Synergie, die stark und effektiv gegen Schmerzen im Körper ist – die Folge: starke Wirkung mit guter Verträglichkeit.

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

IbuHEXAL® plus Paracetamol ist für die Einnahme bei Erwachsenen ab 18 Jahren geeignet. Die empfohlene Tagesdosis ist bis zu dreimal täglich 1 Tablette. Die Tablette ist mit Wasser einzunehmen. Zwischen den einzelnen Dosen sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens 6 Stunden liegen. Innerhalb von 24 Stunden dürfen nicht mehr als 6 Tabletten eingenommen werden (entsprechend 1.200 mg Ibuprofen und 3.000 mg Paracetamol pro Tag). Die Einnahme zusammen mit einer Mahlzeit wird empfohlen.

Dieses Arzneimittel ist speziell anwendbar bei Schmerzen, die durch alleinige Anwendung von Ibuprofen oder Paracetamol nicht gelindert werden können.

IbuHEXAL® plus Paracetamol ist nur für eine kurzfristige Anwendung (nicht länger als 3 Tage) gedacht.

## Das **plus** macht den Unterschied

Die Wirk-Kombi aus Ibuprofen und Paracetamol mit **4-fach-Effekt** gegen Schmerzen:

stark in der Wirkung

**plus** schneller als Ibuprofen alleine (bereits nach 15 min)<sup>1</sup>

**plus** länger anhaltend als Paracetamol alleine (bis zu 8h)

**plus** besser verträglich durch niedrige Ibuprofen Dosierung



A Sandoz Brand

### HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

#### Kann IbuHEXAL® plus Paracetamol während der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden?

Nehmen Sie IbuHEXAL® plus Paracetamol nicht in den letzten 3 Monaten der Schwangerschaft ein. Vermeiden Sie die Einnahme dieses Arzneimittels in den ersten 6 Monaten der Schwangerschaft, falls nicht anders von Ihrem Arzt angeordnet. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie schwanger werden, während Sie IbuHEXAL® plus Paracetamol einnehmen.

Ibuprofen und seine Metaboliten gehen nur in geringen Mengen in die Muttermilch über. IbuHEXAL® plus Paracetamol kann während der Stillzeit eingenommen werden, wenn es in der empfohlenen Dosis und für die kürzestmögliche Dauer eingenommen wird.

#### Darf ich nach der Einnahme von IbuHEXAL® plus Paracetamol Auto fahren?

IbuHEXAL® plus Paracetamol kann zu Schwindel, Konzentrationsstörungen und Benommenheit führen. Wenn Sie davon betroffen sind, führen Sie kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Werkzeuge oder Maschinen.

#### IbuHEXAL® plus Paracetamol 200 mg/500 mg Filmtabletten:

**Wirkstoffe:** Ibuprofen und Paracetamol. **Anwendungsgebiete:** Zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen. Speziell anwendbar bei Schmerzen, die durch alleinige Anwendung von Ibuprofen oder Paracetamol nicht gelindert werden können. Zur Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren. **Warnhinweise:** Enthält Paracetamol. Nicht zusammen mit anderen Paracetamol-haltigen Arzneimitteln einnehmen. Holen Sie im Fall einer Überdosierung umgehend medizinischen Rat ein, auch wenn Sie sich gut fühlen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! **Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke!**

**Mat.-Nr.:** 2/51015372 **Stand:** September 2022  
Hexal AG, 83607 Holzkirchen, [www.hexal.de](http://www.hexal.de)